الحساب المثلثي (الجزء الأول)

I- وحدات قياس الزوايا :

نشاط :

لتكن (C) دائرة مركزها O وشعاعها $R = 1$ و A و B نقطتين من (C) .
 (1) أحسب محيط هذه الدائرة .

(2) ليكن α قياس الزاوية (AOB) بالدرجة و ℓ طول القوس AB المحصورة بهذه الزاوية ،

(أنظر الشكل) نضع $\beta = \frac{\ell}{R}$ ، العدد β يسمى قياس الزوية (AOB) **بالراديان** ،

بين أن : $\frac{\beta}{\pi} = \frac{\alpha}{180}$

(3) أملأ الجدول التالي :

360	180	120	90	60	45	30	0	قياس (AOB) بالدرجة
								قياس (AOB) بالراديان

تعريف :

لتكن (C) دائرة مركزها O وشعاعها 1 و A و B نقطتين منها ، قياس الزاوية (AOB) **بالراديان** هو طول القوس AB المحصورة بهذه الزاوية .

ملاحظة :

- قياس زاوية مستقيمة بالدرجة هو 180 وبالراديان هو π وقياسها بوحدة أخرى تسمى **الغراد** هو 200 .

- إذا كان α و β و γ قياسات الزاوية (AOB) على التوالي بالدرجة والراديان والغراد فإن $\frac{\alpha}{180} = \frac{\beta}{\pi} = \frac{\gamma}{200}$

II- الأفاصل المنحنية لنقطة من دائرة مثلثية :

(1) الدائرة المثلثية :

تعريف :

المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ،
 الدائرة المثلثية هي دائرة مركزها O أصل المعلم وشعاعها 1 وأصلها النقطة $I(1;0)$ وموجهة توجيها موجبا (أو مباشرا)، والتوجيه الموجب هو منحنى الدوران حول الدائرة انطلاقا من I وفي المنحنى المعاكس لمنحنى حركة عقارب الساعة .
 نرمز لهذه الدائرة عادة بالرمز (U) .

(2) الأفاصل المنحنية :

أ) الأفاصل المنحني الرئيسي :

تعريف :

لتكن (U) دائرة مثلثية مركزها O وأصلها I و α عددا من المجال $]-\pi; \pi]$ ،

- في الحالة $0 \leq \alpha \leq \pi$ ، نعتبر النقطة M من (U) بحيث طول القوس IM هو α عند التنقل على (U) في المنحنى الموجب .

- في الحالة $\pi < \alpha < 0$ ، نعتبر النقطة M من (U) بحيث طول القوس IM هو $-\alpha$ عند التنقل على (U) في المنحنى السالب (عكس المنحنى الموجب) .

- في الحالتين معا α يسمى **الأفاصل المنحني الرئيسي** للنقطة M على (U) ونكتب $M(\alpha)$.

ب) الأفاصل المنحنية :

تعريف :

لتكن (U) دائرة مثلثية مركزها O وأصلها I و M نقطة من الدائرة (U) أفصولها المنحني الرئيسي α .

كل عدد حقيقي $x = \alpha + 2k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ يسمى **أفصولا منحنيا** للنقطة M على (U) ونكتب $M(x)$.

مثال :

مثل على الدائرة المثلثية النقط التالية :

$$E\left(\frac{25\pi}{4}\right) \text{ و } D\left(\frac{-2\pi}{3}\right) \text{ و } C\left(\frac{\pi}{6}\right) \text{ و } B\left(\frac{\pi}{3}\right) ، A\left(\frac{-\pi}{4}\right)$$

-III- الزوايا الموجهة وقياساتها :

(1) الزاوية الموجهة لنصفي مستقيم لهما نفس الأصل وقياساتها :

تعريف 1 :

لتكن A و B و O ثلاث نقط بحيث $A \neq O$ و $B \neq O$ ، نصفي المستقيم (OA) و (OB) في هذا الترتيب يحددان زاوية موجهة نرمز لها بالرمز $(OA;OB)$ ، ونرمز لقياسها بالرمز $(\overline{OA;OB})$:

تعريف 2 :

(U) دائرة مثلثية مركزها O وأصلها I و M نقطة منها أفصولها المنحني الرئيسي α - العدد الحقيقي α يسمى القياس الرئيسي للزاوية الموجهة $(OI;OM)$.
- العدد الحقيقي $\alpha + k2\pi$ (حيث $k \in \mathbb{Z}$) يسمى قياسا للزاوية الموجهة $(OI;OM)$ ، ونكتب : $(\overline{OI;OM}) = \alpha + 2k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ أو $(\overline{OI;OM}) \equiv \alpha [2\pi]$ ونقرأ قياس الزاوية $(OI;OM)$ يوافق α بترديد 2π .

خصائص :

لتكن (OA) و (OB) و (OC) ثلاثة أنصاف مستقيمت لها نفس الأصل O ، لدينا :

$$(\overline{OA;OB}) = -(\overline{OB;OA}) + 2k\pi ، (\overline{OA;OA}) = 2k\pi$$

$$(\overline{OA;OC}) = (\overline{OA;OB}) + (\overline{OB;OC}) + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \text{ هذه العلاقة تسمى علاقة شال .}$$

أمثلة :

نعتبر الشكل التالي ، لدينا :

$$(\overline{OB;OC}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi ، (\overline{OA;OB}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$(\overline{OC;OB}) = \frac{-\pi}{2} + 2k\pi ، (\overline{OA;OD}) = \frac{-\pi}{2} + 2k\pi$$

$$(\overline{OA;OC}) = -\pi + 2k\pi ، (\overline{OA;OC}) = \pi + 2k\pi$$

$$(\overline{OB;OD}) = \pi + 2k\pi ، (\overline{OA;OD}) = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

حيث $(k \in \mathbb{Z})$

(2) الزاوية الموجهة لمتجهتين وقياساتها :

تعريف :

ليكن $\vec{v}$ و $\vec{u}$ متجهتين غير منعدمتين و O نقطة من المستوى ،لتكن A و B نقطتين من المستوى بحيث : $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ و $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$.الزاوية الموجهة المحددة بالمتجهتين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ في هذا الترتيب هي الزاوية $(OA;OB)$ ونرمز لها بـ : $(\vec{u};\vec{v})$.قياسات $(\vec{u};\vec{v})$ هي قياسات $(OA;OB)$ ونكتب : $(\vec{u};\vec{v}) = (\overline{OA;OB}) + 2k\pi$ حيث $(k \in \mathbb{Z})$

-IV- النسب المثلثية لعدد حقيقي :

(1) جيب وجيب تمام عدد حقيقي :

تعريف :

لتكن (U) دائرة مثلثية مركزها O وأصلها I و $J\left(\frac{\pi}{2}\right)$ نقطة من (U) ،
 ليكن x عددا حقيقيا و M نقطة من (U) بحيث أحد أفصليها المنحنية هو x .
 ليكن $(x_M; y_M)$ زوج إحداثيتي M في المعلم $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$ ،
 - العدد x_M يسمى **جيب تمام** العدد x ونكتب $\cos x = x_M$.
 - العدد y_M يسمى **جيب** العدد x ونكتب $\sin x = y_M$.

خصائص :

لدينا لكل عدد حقيقي x : $-1 \leq \cos x \leq 1$ و $-1 \leq \sin x \leq 1$ و $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

أمثلة :

جدول بعض القيم الإعتيادية :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

(2) علاقات مثلثية :

خصائص :

لدينا لكل عدد حقيقي x و $k \in \mathbb{Z}$ ، لدينا العلاقات المثلثية التالية :علاقات $\sin$:

$$\sin(-x) = -\sin x \quad \text{و} \quad \sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x \quad \text{و} \quad \sin(\pi - x) = \sin x$$

علاقات $\cos$:

$$\cos(-x) = \cos x \quad \text{و} \quad \cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x \quad \text{و} \quad \cos(\pi - x) = -\cos x$$

علاقات بين $\sin$ و $\cos$:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \quad \text{و} \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x \quad \text{و} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

تمرين تطبيقي :

أحسب جيب وجيب تمام الأعداد التالية :

$$\frac{7\pi}{6} \quad \text{و} \quad \frac{-5\pi}{6} \quad ، \quad \frac{2\pi}{3} \quad ، \quad \frac{3\pi}{4}$$